

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.
Het ZRTI is op werkdagen van
8:00-17:00 uur bereikbaar via het
onderstaande telefoonnummer.

ZRTI
locatie Vlissingen
Koudekerkseweg 90
4382 EK Vlissingen
telefoon 088 - 427 00 00

ZRTI
locatie Roosendaal
Boerhaavelaan 19
4708 AE Roosendaal
telefoon 088 - 427 01 00

Postadres voor beide locaties:
Postbus 380, 4380 AJ Vlissingen

Internet: www.zrti.nl

E-mail: op de website vindt u
een contactformulier waarmee
u ons een e-mail kunt sturen.



CT-scan met jodiumhoudend contrast

Informatie
folder



Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar het ZRTI voor een bestralingsbehandeling. Als voorbereiding wordt er een computertomografie scan (CT-scan) gemaakt. Bij een CT-scan worden met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het te bestralen lichaamsdeel gemaakt.

In uw geval maken we bij de CT-scan ook gebruik van een jodiumhoudend contrastmiddel. Zo kunnen we beter onderscheid maken tussen bloedvaten en de tumor, organen en lymfeklieren. Dit middel krijgt u via een infuus in een ader, meestal in de elleboogplooi. Hierdoor kan de behandelend arts beter bepalen waar de bestraling op gericht moet worden. Een radiotherapeutisch laborant voert de CT-scan uit. Na de CT-scan krijgt u van ons vier plaszakken met een gebruiksaanwijzing. Hierdoor komt de contrastvloeistof niet in het riool terecht.

Belangrijk

- Als u NSAID's (bijvoorbeeld ibuprofen, diclofenac of naproxen) gebruikt mag u deze niet innemen op de dag vóór het onderzoek en op de dag van het onderzoek. De dag na het onderzoek mag u deze weer innemen zoals gebruikelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met uw radiotherapeutisch oncoloog. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.
- Eventuele overige medicijnen mag u gewoon als gebruikelijk innemen.
- Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis als u ze niet kwijt wil raken.
- Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen of andere medicijnen? Bespreek dit met uw radiotherapeutisch oncoloog.
- Het is voor het onderzoek belangrijk dat u 2 uur van tevoren nuchter bent. U mag in deze tijd wel thee of water drinken.

Verloop van het onderzoek

Voorafgaand aan het maken van de CT-scan met contrast plaatsen wij bij u een infuusnaald. De scan duurt ongeveer 30-40 minuten. Het is hierbij belangrijk dat u stil blijft liggen.

Contrastvloeistof

Het ingespoten contrastmiddel kan een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik veroorzaken. Dit trekt binnen enkele minuten weg. In een zeldzaam geval komt het voor dat na toediening van het contrastmiddel bijwerkingen optreden, in de vorm van jeuk, bultjes of roodheid van de huid. Dit kan tot enkele uren na de scan voorkomen. Neem in dit geval contact op met de huisartsenpost (HAP).

Na het onderzoek

Na het onderzoek houden wij u goed in de gaten. Het infuusslangetje verwijderen wij daarom na een half uur. U blijft eerst 15 minuten in de CT-ruimte en daarna 15 minuten in de wachtkamer. Wij adviseren u niet zelf naar huis te rijden maar een taxi te regelen. Drink na het onderzoek 2 à 3 glazen water extra. Het contrastmiddel onttrekt namelijk vocht uit het lichaam. Door het drinken vult u dit weer aan en wordt ook het contrastmiddel sneller uitgescheiden. In principe kunt u uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten, tenzij u in het ziekenhuis opgenomen ligt.

De uitslag

Van dit onderzoek krijgt u geen uitslag. De CT-scan wordt gebruikt om gedetailleerd in kaart te brengen waar in uw lichaam de bestraling plaats gaat vinden.

